



بخش آموزش رسانه تفریحی سنتر

کلیک کنید  www.tafrihicenter.ir/edu

 نمونه سوال  گام به گام

 امتحان نهایی  جزوه

 دانلود آزمون های آزمایشی

متوسطه اول : هفتم ... هشتم ... نهم

متوسطه دوم : دهم ... یازدهم ... دوازدهم

www.tafrihicenter.ir

بخش پذیری و تقسیم

عضو ابتدای یک مجموعه: اگر $A \subseteq \mathbb{R}$ در این صورت عدد x را عضو ابتدای A می‌گوییم و می‌نویسیم

$$\min A = x \text{ هرگاه:}$$

۱. x عضو A باشد.

۲. x از تمام اعضای A کوچک‌تر یا مساوی باشد.

عضو انتهای یک مجموعه: اگر $A \subseteq \mathbb{R}$ در این صورت عدد x را عضو انتهای A می‌گوییم و می‌نویسیم

$$\max A = x \text{ هرگاه:}$$

۱. x عضو A باشد.

۲. x از تمام اعضای A بزرگ‌تر یا مساوی باشد.

نکته: ممکن است یک مجموعه عضو ابتدا و یا انتها نداشته باشد.

مثال ۱: وجود عضو ابتدا و انتها را در مجموعه‌های زیر بررسی کنید.

$$۱) A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 9\} \quad ۲) B = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 9\} \quad ۳) C = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 < x \leq 9\}$$

اصل خوش‌ترتیبی: هر زیرمجموعه‌ی ناتهی از مجموعه‌ی اعداد طبیعی دارای عضو ابتدا (کوچک‌ترین عضو) است.

اصل استقرای ریاضی: اگر زیر مجموعه‌ای از اعداد طبیعی هر دو ویژگی زیر را داشته باشد، آن‌گاه با خود

مجموعه‌ی اعداد طبیعی برابر است.

۱. عدد ۱ متعلق به آن زیر مجموعه باشد.

۲. در صورت موجود بودن عدد طبیعی مانند t در آن زیر مجموعه، عدد طبیعی $t+1$ نیز در آن زیرمجموعه باشد.

اصل استقرای قوی ریاضی: اگر زیر مجموعه‌ای از اعداد طبیعی هر دو ویژگی زیر را داشته باشد، آن‌گاه با خود

مجموعه‌ی اعداد طبیعی برابر است.

۱. عدد ۱ متعلق به آن زیر مجموعه باشد.

۲. در صورت موجود بودن همه‌ی اعداد طبیعی کوچک‌تر از t در آن زیر مجموعه، عدد طبیعی t نیز در آن زیرمجموعه باشد.

بخش‌پذیری: عدد صحیح a را بر عدد صحیح غیر صفر b بخش‌پذیر می‌گوییم هرگاه عدد صحیحی مانند q چنان

یافت شود که $a = b \times q$. بخش‌پذیری a بر b را به صورت $b \mid a$ نشان می‌دهیم و بخش‌پذیر نبودن a بر b را به

$$\text{صورت } b \nmid a \text{ نشان می‌دهیم.} \quad b \mid a \Leftrightarrow a = bq \quad (q \in \mathbb{Z})$$

قرار داد: چون بی‌شمار عدد صحیح مانند q یافت می‌شود که در تساوی $0 = 0 \times q$ صدق می‌کند، قرارداد می‌کنیم

که صفر بر خودش بخش‌پذیر است یعنی $0 \mid 0$.

ویژگی های بخش پذیری:

(در تمام فرمول های زیر، پایه ها، اعداد صحیح و توان ها، اعداد طبیعی اند.)

۱) $\pm 1 | a$

۲) $a | 1 \Rightarrow a = 1 \text{ or } a = -1$

۳) $\pm a | a$

۴) $a | 0$

۵) $a | b \Rightarrow \begin{cases} a | -b \\ -a | b \\ -a | -b \end{cases}$

۶) $a | b \xrightarrow{b \neq 0} |a| \leq |b|$

۷) $a | b \Rightarrow a | mb$

۸) $a | b \Rightarrow ma | mb$

۹) $a | b \Rightarrow a | b^n$

۱۰) $a | b \Rightarrow a^n | b^n$

۱۱) $a | b \xrightarrow{m < n} a^m | b^n$

۱۲) $a^m | b^n \xrightarrow{m > n} a | b$

۱۳) $a | b, a | c \Rightarrow \begin{cases} a | b \pm c \\ a | b \times c \\ a | mb \pm nc \end{cases}$

۱۴) $a | b, c | d \Rightarrow ac | bd$

۱۵) $a | b, b | a \Rightarrow a = \pm b$

۱۶) $a | b \Rightarrow a | ma \pm nb$

۱۷) $ab | c \Rightarrow a | c, b | c$

۱۸) $(a - b) | (a^n - b^n)$

۱۹) $\frac{n}{m} \in \mathbb{N} \Rightarrow (a^m - b^m) | (a^n - b^n)$

۲۰) $\frac{n}{m} = 2k + 1 \Rightarrow (a^m + b^m) | (a^n + b^n) \Rightarrow n = 2k + 1 \Rightarrow (a + b) | (a^n + b^n)$

۲۱) $\frac{n}{m} = 2k \Rightarrow (a^m + b^m) | (a^n - b^n) \Rightarrow n = 2k \Rightarrow (a + b) | (a^n - b^n)$

۲۲) حاصل ضرب n عدد صحیح متوالی بر $n!$ بخش پذیر است.مثال ۲: باقی مانده ی تقسیم $8^{1394} - 14^{1394}$ را بر ۶ بیابید.مثال ۳: باقی مانده ی تقسیم عدد $3^{36} - 2^{36}$ را بر ۳۵ بیابید.

مثال ۴: درستی یا نادرستی گزاره های زیر را بررسی کنید.

۱) $a | b \Rightarrow a^r | b^r$

۲) $a^r | b^r \Rightarrow a | b$

مثال ۵: تمام مقادیر صحیح n را چنان بیابید که حاصل $\frac{4n-2}{n+1}$ یک عدد صحیح باشد.

مثال ۶: اگر $\frac{n^2+4}{n+1}$ یک عدد صحیح باشد آن گاه برای n چند جواب صحیح وجود دارد؟

مثال ۷: چند عدد صحیح مانند a می توان یافت به طوری که در هر دو رابطه ی $a \mid 240$ و $a \mid 12$ صدق کنند.

مثال ۸: چند عدد طبیعی مانند d وجود دارد که $d \mid 450$ و $d \mid 15$.

قضیه ی تقسیم: اگر a عدد صحیح و b یک عدد طبیعی دلخواه باشند، آن گاه دو عدد صحیح منحصر به فردی مانند r و q چنان یافت می شوند که $a = bq + r$ و $0 \leq r < b$. در این حالت q را خارج قسمت، r را باقی مانده، a را مقسوم و b را مقسوم علیه می گوییم.

مثال ۹: عدد -487 را بر 23 تقسیم کرده و باقی مانده و خارج قسمت را تعیین کنید.

نکته: هر عدد صحیح را می توان به یکی از دو صورت $2k$ و $2k+1$ و یا به یکی از سه صورت $3k$ و $3k+1$ و $3k+2$ نمایش داد.

نکته: مربع هر عدد زوج، مضرب 4 می باشد.

نکته: باقیمانده ی یک عدد در تقسیم بر 4 ، باقیمانده ی عدد حاصل ازدو رقم سمت راست آن عدد در تقسیم بر 4 می باشد.

نکته: باقیمانده ی یک عدد در تقسیم بر 8 ، باقیمانده ی عدد حاصل از سه رقم سمت راست آن عدد در تقسیم بر 8 می باشد.

نکته: مربع هر عدد فرد در تقسیم بر 8 باقیمانده ی یک می آورد. به عبارت دیگر $a^2 = 8q + 1 \Rightarrow a = 2k + 1$.

مثال ۱۰: کدام یک از اعداد زیر مربع کامل است؟

(۱) ۷۴۵۱۹ (۲) ۷۴۵۲۹ (۳) ۷۴۵۳۹ (۴) ۷۴۵۴۹

مثال ۱۱: از بین اعداد 1 و 11 و 111 و 1111 و ... چه تعدادی مربع کامل هستند؟

نکته: هیچ مربع کاملی نمی تواند به یکی از ارقام 2 و 3 و 7 و 8 ختم شود.

نکته: اگر مربع کاملی به 5 ختم شود، لازم است رقم دهگان آن مربع کامل برابر 2 باشد.

نکته: تعداد مضارب طبیعی عدد طبیعی b در بین اعداد $1, 2, 3, \dots, n$ برابر $\left\lfloor \frac{n}{b} \right\rfloor$ می باشد.

مثال ۱۲: چند عدد طبیعی مضرب 3 کوچکتر یا مساوی 100 وجود دارد؟

نکته: تعداد مضارب طبیعی عدد طبیعی b در بین اعداد $k+1, k+2, \dots, k+n$ برابر $\left\lfloor \frac{k+n}{b} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{k}{b} \right\rfloor$ می باشد.

مثال ۱۳: تعداد اعداد سه رقمی که بر 34 بخش پذیر باشند چقدر است؟

مثال ۱۴: معادله ی $x^2 + y^2 = 1383$ در مجموعه ی اعداد صحیح چند دسته جواب دارد؟

مثال ۱۵: در یک تقسیم، باقی مانده برابر 29 و خارج قسمت برابر 7 می باشد. حداکثر چند واحد می توان به مقسوم علیه اضافه کرد بدون این که مقسوم و خارج قسمت تغییر نمایند؟

مثال ۱۶: در یک تقسیم، اگر 200 واحد به مقسوم و 3 واحد به مقسوم علیه اضافه کنیم، خارج قسمت تغییر نکرده ولی از باقی مانده 22 واحد کم می شود. خارج قسمت را بیابید.

مثال ۱۷: در یک تقسیم، مقسوم w و سرج سمت 11 می‌باشد. تعیین سید مقسوم علیه چه مقادیری می‌تواند داشته باشد.

مثال ۱۸: اگر باقی‌مانده‌ی تقسیم عدد a بر اعداد 6 و 7 به ترتیب برابر 5 و 6 باشد، آن‌گاه باقی‌مانده‌ی تقسیم a بر 42 کدام است؟

عدد اول:

یک عدد طبیعی را اول گوییم هرگاه در مجموعه‌ی اعداد طبیعی، دو و فقط دو مقسوم علیه مثبت داشته باشد که یکی از آن دو مقسوم‌علیه عدد 1 و دیگری خود آن عدد است. عددی که اول نباشد، مرکب خوانده می‌شود.

نکته: هر عدد اول بزرگ‌تر از 3 به یکی از دو شکل $6k+1$ و $6k-1$ (یا $6q+5$) می‌باشد. (به عبارتی اگر باقی‌مانده‌ی تقسیم یک عدد بر 6 ، عددی بجز 1 و 5 باشد، آن عدد اول نیست). در عین حال، ممکن است عددی به شکل $6k+1$ و $6k-1$ باشد ولی اول نباشد؛ مثل $25 = 6 \times 4 + 1$.

نکته: تنها عدد اولی که زوج است عدد 2 می‌باشد. (اعداد اول: 2 و 3 و 5 و 7 ...)

مثال ۱۹: مجموع دو عدد اول برابر 91 شده است. مجموع ارقام حاصل ضرب آن دو عدد را بیابید.

مثال ۲۰: دو عدد طبیعی a و b چنانند که $a^2 = b^2 + 41$ ، مجموع ارقام عدد $a + 2b$ را بیابید.

قضیه: بی‌نهایت عدد اول وجود دارد. (مجموعه‌ی اعداد اول مجموعه‌ای نامتناهی است)

قضیه: عدد n اول است هرگاه به هیچ یک از اعداد طبیعی کوچکتر یا مساوی $\sqrt{n}$ بخش‌پذیر نباشد.

تجزیه‌ی یک عدد به حاصل ضرب عوامل اول:

هر عدد طبیعی بزرگ‌تر از 1 را می‌توان به صورت حاصل ضرب عوامل اول تجزیه کرد.

نکته: اگر پس از تجزیه‌ی یک عدد، توان تمام عامل‌های اول عددی زوج باشند، آن عدد، مربع کامل است و اگر مضرب سه باشند، مکعب کامل است.

مثال ۲۱: با توجه به تجزیه‌ی عدد 1380 ، مربع کامل بودن آن را بررسی کنید.

نکته: اگر عدد n به صورت $n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \dots \times p_k^{\alpha_k}$ به حاصل ضرب اعداد اول تجزیه شده باشد، آن‌گاه تعداد تعداد مقسوم‌علیه‌های مثبت عدد n برابر $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \dots (\alpha_k + 1)$ خواهد بود.

مثال ۲۲: تعداد مقسوم‌علیه‌های مثبت عدد 50 را بیابید.

مثال ۲۳: کدام یک از اعداد زیر دارای 27 مقسوم‌علیه مثبت می‌باشد؟

(۱) 1963 (۲) 1764 (۳) 1862 (۴) 2178

نکته: تعداد عوامل اول p موجود در $n!$ از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$$

مثال ۲۴: در تجزیه‌ی عدد $50!$ ، نواح عدد ۱ پیدا است.

مثال ۲۵: تعداد صفرهای واقع در انتهای عدد $n!$ با تعداد عوامل ۵ موجود در $n!$ یعنی مقدار زیر برابر است.

$$\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{5^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{5^3} \right\rfloor + \dots$$

مثال ۲۶: تعداد صفرهای موجود در انتهای $79!$ چقدر است؟

مثال ۲۷: بیش‌ترین مقدار k برای آن‌که $194!$ بر 21^k بخش‌پذیر باشد، چقدر است؟

بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد

برای به دست آوردن بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک چند عدد، هر یک از آن‌ها را به حاصل ضرب عامل‌های اول تجزیه کرده و سپس عامل‌های مشترک با توان کم‌تر را در یکدیگر ضرب می‌کنیم.

ب.م.م دو عدد a و b را با نماد (a, b) نمایش می‌دهیم.

مثال ۲۸: بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد 450 و 1008 را بیابید.

نکته: $(a, b) = d \Rightarrow d | a, d | b$.

مثال ۲۹: اگر $(3a + 5, 5a + 4) = d$ ، آن‌گاه مقدار d را بیابید.

مثال ۳۰: اگر $(a - 5, a^2 - 6a + 3) = d$ ، آن‌گاه مقدار d را بیابید.

نکته: مجموعه‌ی مقسوم علیه‌های مشترک دو عدد a و b با مجموعه‌ی مقسوم علیه‌های ب.م.م آن دو عدد برابر است؛ یعنی اگر $x | a$ و $x | b$ آن‌گاه $x | (a, b)$.

مثال ۳۱: بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد a و b برابر با ۷۲ می‌باشد. آن دو عدد چند مقسوم علیه مشترک دارند؟

ترکیب خطی دو عدد: به ازای هر $m, n \in \mathbb{Z}$ ، $ma + nb$ را یک ترکیب خطی a و b می‌گوییم.

نکته: $(a, b) = d \Leftrightarrow \exists m, n \in \mathbb{Z}, ma + nb = d$.

دو عدد متباین (نسبت به هم اول): دو عدد a و b را نسبت به هم اول گوییم هرگاه $(a, b) = 1$.

نکته: اگر برای اعداد صحیح a و b ، اعداد صحیحی مانند r و s چنان یافت شوند که $ra + sb = 1$ ، آن‌گاه $(a, b) = 1$.

نکته: اگر a در تقسیم بر b باقیمانده‌ی r داشته باشد، آن‌گاه $(a, b) = (b, r)$.

مثال ۳۲: اگر $(a, b) = d$ ، آن‌گاه $(a, 5a + d)$ چقدر است؟

نکته: اگر دو عدد نسبت به هم اول باشند، آن‌گاه حاصل ضرب و حاصل جمع (تفاضل) آن دو عدد نیز نسبت به هم

اولند، یعنی: $(a, b) = 1 \Rightarrow (a \pm b, ab) = 1$

نکته: هر دو عدد صحیح متوالی نسبت به هم اولند و بر سر دو عدد صحیح ترب مساوی نسبت به هم اولند.

$$\left. \begin{matrix} (a, b) = 1 \\ (a, c) = 1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow (a, bc) = 1$$

لم اقلیدس: اگر $a \mid bc$ و $(a, b) = 1$ ، آن گاه $a \mid c$.

نکته: اگر p عددی اول باشد و $p \mid ab$ آن گاه $p \mid a$ و $p \mid b$.

مثال ۳۳: اگر $(b, d) = 1$ و $(a - 2b, 3a - b) = d$ ، آن گاه مقدار d را بیابید.

نکته: اگر $(a, b) = d$ ، آن گاه روابط زیر برقرارند.

$$1) (ka, kb) = |k|d \quad k \in \mathbb{Z} - \{0\}$$

$$2) \left(\frac{a}{k}, \frac{b}{k}\right) = \frac{d}{|k|} \quad k \mid d$$

$$3) (a^n, b^n) = d^n \quad n \in \mathbb{N}$$

قضیه ی بزو: بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد صحیح a و b که حداقل یکی از آنها صفر نیست، برابر

است با کوچک ترین عضو مجموعه ی $S = \{ma + nb > 0 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$.

مثال ۳۴: عضو ابتدای مجموعه ی $A = \{42r + 12s > 0 \mid r, s \in \mathbb{Z}\}$ را بیابید.

کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد

برای به دست آوردن کوچک ترین مضرب مشترک چند عدد، هر یک از آنها را به حاصل ضرب عامل های اول تجزیه کرده و سپس عامل های مشترک با توان بیشتر و همچنین عامل های غیر مشترک را در یکدیگر ضرب می کنیم.

مثال ۳۵: کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد 450 و 1008 را بیابید.

$$\left\{ \begin{matrix} a = a'd, b = b'd, (a', b') = 1 \\ [a, b] = a'b'd \end{matrix} \right.$$

نکته: اگر $(a, b) = d$ ، آن گاه می توان نوشت:

$$(a, b).[a, b] = |ab| \quad \text{آن گاه}$$

مثال ۳۶: کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد طبیعی 13 برابر بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک آن دو عدد

می باشد، اگر مجموع این دو عدد برابر 126 باشد، آن گاه ب.م.ا.ن دو عدد را بیابید.

مثال ۳۷: مجموع دو عدد طبیعی، برابر 504 و ب.م.ا.ن دو عدد برابر 36 است. کم ترین مقدار طبیعی برای تفاضل

آن دو عدد را بیابید.

همنهشتی

اگر دو عدد صحیح a و b در تقسیم بر عدد طبیعی m ($m \geq 2$) باقی مانده ی یکسانی مانند r داشته باشند،

آن گاه دو عدد a و b را همنهشت با یکدیگر به پیمانه ی m میگوئیم و آن را به صورت $a \equiv b \pmod{m}$ یا

(پیمانه m) $a \equiv b$ نشان می دهیم.

نکته: اگر $a \equiv b^m$ آن گاه عدد صحیحی مثل q وجود دارد به طوری که: $a - b = mq$.

خواص همنهشتی:

در تمام روابط زیر a, b, c, d اعداد صحیح و m عددی طبیعی بزرگتر از ۱ می باشد.

$$۱) a \equiv a^m$$

$$۲) a \equiv b \Rightarrow b \equiv a^m$$

$$۳) (a \equiv b, b \equiv c) \Rightarrow a \equiv c^m$$

$$۴) (a \equiv b, c \equiv d) \Rightarrow a \pm c \equiv b \pm d^m$$

$$۵) (a \equiv b, c \equiv d) \Rightarrow ac \equiv bd^m$$

$$۶) (a \equiv b) \Rightarrow (a \pm c \equiv b \pm c, ac \equiv bc)^m$$

$$۷) a \equiv b \Rightarrow a^n \equiv b^n^m$$

$$۸) (a \equiv b, a \equiv b^n) \Leftrightarrow a \equiv b^{[m,n]}$$

$$۹) (a \equiv b, n | m) \Rightarrow a \equiv b^n$$

$$۱۰) (ac \equiv bc, d = (m, c)) \Rightarrow a \equiv b^{\frac{m}{d}}$$

مثال ۳۸: باقی مانده ی تقسیم $۳۵^{۴۰}$ بر ۹ را بیابید.

مثال ۳۹: باقی مانده ی تقسیم $۳^{۱۶} + ۵$ بر عدد ۷ را بیابید.

مثال ۴۰: باقی مانده ی تقسیم $۴۲ \times ۱۸^n + ۲۳ \times ۵^n$ بر ۱۳ را بیابید.

مثال ۴۱: عدد $۲^{۱۳۸۴}$ در تقسیم بر ۱۳ چه باقی مانده ای دارد؟

مثال ۴۲: باقی مانده ی تقسیم عدد $۲^{۶۹}$ بر ۱۷ را بیابید.

مثال ۴۳: کوچک ترین عدد طبیعی a که به ازای آن، $a + ۲^{۶۴}$ بر ۵ بخش پذیر باشد چقدر است؟

مثال ۴۴: اگر $a \equiv ۲$ و $a \equiv ۴$ ، آنگاه a در تقسیم بر ۲۴ چه باقی مانده ای دارد؟

مثال ۴۵: کوچک ترین عدد طبیعی را بیابید که با ازای آن رابطه ی $۴x \equiv ۳^{۱۵}$ برقرار باشد.

کلاس هم ارزی (دسته ی هم ارزی): کلاس هم ارزی a مجموعه ای از اعداد صحیح است که هر یک از آن ها به

$$پیمانه ی m با a همنهشت باشند. [a]_m = \{x | x \in \mathbb{Z}, x \equiv a^m\}$$

مثال ۴۶: عدد -۲۰۷ به کدام دسته ی هم ارزی به پیمانه ی ۸ قرار دارد؟

$$(۱) [۱] \quad (۲) [۳] \quad (۳) [۵] \quad (۴) [۷]$$

مثال ۴۷: کدام دو عدد زیر متعلق به یک دسته ی همنهشتی به پیمانه ی ۷ هستند؟

$$(۱) ۹۶۲۷ \quad (۲) ۹۶۲۸ \quad (۳) ۹۶۲۶ \quad (۴) ۹۶۲۵$$

مثال ۴۸: اگر $۲a - ۱$ عضوی از دسته ی همنهشتی $۳a - ۳$ به پیمانه ی ۶ باشد، آن گاه a کدام می تواند باشد؟

$$(۱) ۱۳۸۱ \quad (۲) ۱۳۸۲ \quad (۳) ۱۳۸۳ \quad (۴) ۱۳۸۴$$

قضیه‌ی فرما: اگر p عددی اول بوده و عدد صحیح a چنان باشد که $(a, p) = 1$ ، آن‌گاه: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

نکته: برای محاسبه‌ی رقم یکان اعداد توان‌دار، به جای پایه، رقم یکان و به جای توان، اگر توان مضرب ۴ باشد، به جای توان عدد ۴ و در غیر این صورت باقی‌مانده‌ی تقسیم آن بر ۴ را در نظر می‌گیریم.

مثال ۴۹: رقم یکان عدد 1392^{1392} را بیابید.

مثال ۵۰: رقم یکان عدد $1383^{1384} \times 2$ را بیابید.

مثال ۵۱: رقم یکان عدد $27^{23} + 43^{17}$ را بیابید.

مثال ۵۲: رقم یکان عدد $(49! + 73! + 82!)^{42!}$ را بیابید.

نمایش اعداد در مبناهای مختلف

می‌دانیم عدد 492_{10} که در مبنای 10 نوشته شده است، به صورت $4 \times 10^2 + 9 \times 10^1 + 2 \times 10^0$ نیز قابل نمایش است و نیز عدد 5726_8 که در مبنای هشت نوشته شده است، به صورت $5 \times 8^3 + 7 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 6 \times 8^0$ نیز قابل نمایش است. بنابر این هر عددی در یک مبنای خاص، قابل تبدیل به مبنای دیگر می‌باشد.

نکته: برای تبدیل هر عددی از مبنای 10 به مبنایی غیر از 10 ، از تقسیم‌های متوالی و برای تبدیل عددی از مبنای غیر 10 به مبنای 10 از ضرب‌های متوالی استفاده می‌کنیم.

نکته: برای تبدیل عددی از مبنای غیر 10 به مبنای غیر 10 می‌توان ابتدا آن را به مبنای 10 برد و سپس به مبنای غیر 10 خواسته شده تبدیل کرد.

نکته: اگر یک عدد در مبنای n نوشته شود، حتماً هر یک از ارقام آن کمتر از n خواهند بود.

مثال ۵۳: عدد $(2103)_p$ را به مبنای 10 ببرید.

مثال ۵۴: عدد 357 را که در مبنای 10 نوشته شده است به مبنای 2 ببرید.

مثال ۵۵: عدد $(1102)_p$ را به عددی در مبنای 4 ببرید.

مثال ۵۶: عدد $4 + 2 \times 8^2 + 3 \times 8^4$ را به مبنای 8 ببرید.

مثال ۵۷: عدد $11 + 69 \times 8^2 + 13 \times 8^3$ را به مبنای 8 ببرید.

مثال ۵۸: عدد $(10111011)_p$ را به مبنای 8 ببرید. (چون $8 = 2^3$ لذا اعداد را از سمت راست، ۳ تا ۳ تا جدا کرده و هر کدام از این اعداد سه تایی را به مبنای 8 تبدیل می‌کنیم و برای تبدیل از مبنای 8 به 2 برعکس عمل می‌کنیم، یعنی هر عدد از مبنای 8 ، ۳ رقم از آن عدد را در مبنای 2 تشکیل می‌دهد)

مثال ۵۹: حاصل عدد $(3754)_8$ را در مبنای 2 بنویسید.

مثال ۶۰: اگر $(134)_{x+1} = (213)_x$ ، در این صورت $(111)_x$ را بیابید.

مثال ۶۱: اگر عدد دو رقمی $(ab)_p$ با عدد $(ba)_q$ برابر باشد، مقادیر a و b را بیابید.

مثال ۶۲: عدد $65!$ در مبنای 6 به چند صفر ختم می‌شود؟

مثال ۶۷: پستخانه‌ای فقط تمبرهای ۲۱۰ ریالی و ۱۴۰ ریالی برای فروش دارد. بسته‌ای نیاز به ۱۴۷۰ ریال تمبر دارد. چند تمبر ۲۱۰ ریالی و چند تمبر ۱۴۰ ریالی باید بخرد.